



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

REGION LORRAINE

Bulletin technique n° 5 du 25 mars 1999

Colza

Les colzas sont au stade boutons accolés. Ils commencent à monter, mais n'ont pas encore atteint le stade tige 20 cm.

Ravageurs

Continuer à surveiller les cuvettes. Les colzas sont sensibles au charançon de la tige jusqu'au stade tige 20 cm.

Les mélégières sont présents, mais le traitement contre le charançon a permis de limiter les populations. Le seuil de nuisibilité est de 1 insecte par inflorescence au stade boutons accolés et 2 à 3 insectes par inflorescence au stade boutons séparés.

Maladies

Des taches de phoma sont visibles sur les feuilles. Aucun symptôme sur collet ou pivot n'a encore été observé.

Nous n'avons pas observé d'autres maladies.

Aucun traitement fongicide n'est à réaliser.

Céréales

Les premières atteignent le stade épi 1 cm.

Piétin verse

Le risque reste à un niveau faible (graphique 1). Seules les parcelles en blé sur blé ont tendance à évoluer

et s'écartent sensiblement du risque moyen (graphique 2). Un traitement spécifique a cependant peu de chance d'être rentabilisé. Si néanmoins vous souhaitez protéger votre parcelle, l'application pourra être placée entre le stade épi 1 cm et 2 noeuds en utilisant indifféremment un Unix ou un produit à base de prochloraz, ce dernier ayant l'avantage de posséder une action vis-à-vis de la septoriose.

Raccourcisseurs

Si les températures continuent à rester douces, les raccourcisseurs de type C3 ou C5 seront à appliquer dans les prochains jours.

Mosaïque de l'orge

Des jaunissements sont observés, surtout dans les parcelles d'orge. Ils sont habituels et provisoires dans la majorité des cas, le temps pour la plante de redémarrer et de se remettre des stress hydriques ou dûs au froid. Cependant, dans quelques parcelles on observe de la mosaïque. Si les attaques sont plus ou moins prévisibles sur des variétés sensibles de type Plaisant, elles sont plus ennuyeuses sur variétés tolérantes. Sur ces dernières, les dégâts observés ces années dernières étaient moins importants que sur variétés sensibles. Les cas semblent devenir de plus en plus fréquents. Sur ces parcelles, la protection fongicide devra rester identique.

Colza :

Traitements fongicides inutiles.

Blé :

Bientôt les premiers raccourcisseurs.

HoJo
50614
+ P
D3
B.F.
G.T.

P133

